







У випадку розвитку небажаних побічних дій слід зменшувати дозу або короткочасно (на 1-2 дні) переривати застосування препарату. Слиновиділення та зниження частоти серцевих скорочень можна зменшити м-холіноблокаторами (атропін тощо.)

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 1 мл розчину для ін'єкцій (5 мг/мл або 15 мг/мл) в ампулі.

10 ампул у контурній чарунковій упаковці в картонній пачці.

**Категорія відпуску.**

За рецептом.

**Виробник.**

АТ «Олайнфарм»/JSC «Olainfarm» (дозвіл на випуск серії).

АТ «Софарма»/ «Sofarma» PLC (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка).

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Вул. Рупніцу 5, Олайне, LV-2114 Латвія/5 Rupnicu street, Olaine, LV-2114, Latvia.

Лієнське шосе 16, Софія 1220, Болгарія/ 16, Iliensko Shose Str., 1220 Sofia, Bulgaria.

**Дата останнього перегляду.**